



下田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 431	426	366.5	116.2	107.4	125.8	▲▲	1 333	123	109.0	112.9	95.4	133.5	▲
メタボ予備群	1 431	257	233.1	110.2	98.7	123.1	▲	1 333	90	67.1	134.2	110.0	163.7	▲▲
肥満者	1 431	805	735.8	109.4	104.5	114.5	▲▲	1 333	345	313.8	110.0	100.4	120.4	▲▲
高血圧症有病者	1 443	751	642.0	117.0	111.3	122.9	▲▲	1 338	514	449.0	114.5	107.0	122.5	▲▲
高血圧症予備群	1 443	193	174.0	110.9	97.3	126.5	▲	1 338	184	145.3	126.7	110.8	144.8	▲▲
脂質異常症有病者	1 440	872	852.7	102.3	98.1	106.6	▲	1 336	762	736.6	103.5	98.8	108.4	▲
糖尿病有病者	1 384	212	201.9	105.0	92.8	118.8	▲	1 296	79	90.7	87.1	70.3	107.7	▽
糖尿病予備群	1 384	171	193.6	88.3	76.8	101.6	▽	1 296	85	144.2	58.9	48.0	72.4	▽▽
習慣的喫煙者	1 463	481	455.2	105.7	98.2	113.7	▲	1 357	127	107.6	118.0	100.0	139.2	▲▲

東伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 077	317	285.4	111.1	101.3	121.8	▲▲	989	88	87.3	100.8	82.6	123.1	▲
メタボ予備群	1 077	220	174.7	125.9	112.0	141.7	▲▲	989	62	50.5	122.8	96.6	156.2	▲
肥満者	1 077	625	556.6	112.3	106.7	118.1	▲▲	989	261	236.0	110.6	99.7	122.7	▲
高血圧症有病者	1 078	547	503.0	108.7	102.5	115.3	▲▲	997	403	363.2	111.0	102.9	119.6	▲▲
高血圧症予備群	1 078	154	129.4	119.0	102.9	137.7	▲▲	997	150	113.0	132.8	114.6	153.8	▲▲
脂質異常症有病者	1 078	669	641.4	104.3	99.6	109.3	▲	996	605	579.8	104.3	99.3	109.7	▲
糖尿病有病者	1 055	148	162.7	91.0	78.4	105.6	▽	982	54	75.4	71.7	55.3	92.8	▽▽
糖尿病予備群	1 055	114	151.7	75.2	63.2	89.4	▽▽	982	79	118.1	66.9	54.2	82.6	▽▽
習慣的喫煙者	1 101	358	327.7	109.2	100.3	118.9	▲▲	1 007	114	73.8	154.5	130.0	183.5	▲▲

河津町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	588	154	149.9	102.7	89.7	117.7	▲	485	41	40.2	102.1	76.2	136.8	▲
メタボ予備群	588	113	95.9	117.9	99.9	139.1	▲	485	28	24.4	115.0	80.3	164.6	▲
肥満者	588	313	302.0	103.6	96.1	111.8	▲	485	117	114.3	102.3	87.4	119.8	▲
高血圧症有病者	593	305	262.3	116.3	107.5	125.7	▲▲	486	179	165.4	108.2	96.3	121.5	▲
高血圧症予備群	593	81	71.5	113.3	92.6	138.7	▲	486	62	53.0	116.9	92.7	147.5	▲
脂質異常症有病者	591	336	349.2	96.2	89.7	103.2	▽	487	276	269.8	102.3	94.7	110.5	▲
糖尿病有病者	579	89	83.9	106.1	87.6	128.4	▲	479	24	34.0	70.7	47.9	104.3	▽
糖尿病予備群	579	68	80.2	84.8	67.8	106.0	▽	479	27	53.7	50.3	34.9	72.5	▽▽
習慣的喫煙者	599	202	185.6	108.9	97.3	121.8	▲	493	37	38.7	95.7	70.2	130.5	▽

南伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	534	150	139.2	107.8	94.1	123.4	▲	547	31	46.4	66.8	47.4	94.0	▽▽
メタボ予備群	534	96	86.7	110.7	92.4	132.6	▲	547	23	27.5	83.6	56.0	124.6	▽
肥満者	534	286	275.1	104.0	96.1	112.5	▲	547	103	129.4	79.6	66.9	94.7	▽▽
高血圧症有病者	540	296	246.7	120.0	111.1	129.5	▲▲	548	249	191.5	130.1	118.7	142.5	▲▲
高血圧症予備群	540	77	64.8	118.8	96.6	146.1	▲	548	81	60.7	133.5	109.2	163.2	▲▲
脂質異常症有病者	535	293	317.0	92.4	85.6	99.8	▽▽	546	286	307.3	93.1	85.9	100.8	▽
糖尿病有病者	526	83	78.4	105.8	86.9	128.9	▲	540	29	39.5	73.4	51.5	104.5	▽
糖尿病予備群	526	63	73.7	85.4	67.8	107.7	▽	540	35	62.1	56.3	40.9	77.6	▽▽
習慣的喫煙者	552	168	165.9	101.3	89.3	114.9	▲	557	55	42.5	129.5	100.8	166.3	▲▲

松崎町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	520	144	136.5	105.5	91.8	121.2	▲	512	36	44.0	81.8	59.7	112.0	▽
メタボ予備群	520	99	84.4	117.3	98.3	140.0	▲▲	512	31	26.0	119.4	84.9	167.9	▲▲
肥満者	520	293	268.4	109.2	101.2	117.7	▲▲	512	121	121.4	99.7	85.3	116.4	▽
高血圧症有病者	525	260	241.4	107.7	98.8	117.4	▲	513	212	180.7	117.3	105.8	130.1	▲▲
高血圧症予備群	525	78	63.2	123.4	100.5	151.4	▲▲	513	62	57.4	108.1	85.6	136.5	▲
脂質異常症有病者	522	328	310.4	105.7	98.9	112.9	▲	513	279	293.6	95.0	87.8	102.9	▽
糖尿病有病者	510	72	77.4	93.1	75.1	115.2	▽	508	27	37.8	71.5	49.5	103.1	▽
糖尿病予備群	510	53	73.2	72.4	56.1	93.4	▽▽	508	41	59.7	68.6	51.2	92.0	▽▽
習慣的喫煙者	536	146	163.1	89.5	77.9	102.8	▽	520	29	39.3	73.9	51.9	105.2	▽

西伊豆町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	535	167	139.6	119.6	105.5	135.6	▲▲	561	55	48.3	113.8	88.6	146.2	▲
メタボ予備群	535	85	87.0	97.7	80.4	118.7	▽	561	24	28.4	84.6	57.2	125.0	▽
肥満者	535	300	276.0	108.7	100.9	117.2	▲▲	561	152	133.1	114.2	99.7	130.8	▲
高血圧症有病者	538	303	246.0	123.2	114.4	132.7	▲▲	560	239	197.6	121.0	109.9	133.2	▲▲
高血圧症予備群	538	66	64.8	101.8	81.3	127.6	▲	560	72	62.6	115.1	92.8	142.7	▲
脂質異常症有病者	540	334	320.7	104.1	97.5	111.3	▲	562	345	320.9	107.5	100.7	114.8	▲▲
糖尿病有病者	526	88	79.2	111.1	91.9	134.5	▲	558	43	41.4	104.0	78.0	138.5	▲
糖尿病予備群	526	55	74.6	73.8	57.5	94.7	▽▽	558	52	65.1	79.8	61.6	103.4	▽
習慣的喫煙者	561	190	170.4	111.5	99.4	125.2	▲	577	59	43.5	135.8	106.6	172.8	▲▲

熱海市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 934	618	514.4	120.1	112.6	128.2	▲▲	2 191	214	199.3	107.4	94.6	121.9	▲
メタボ予備群	1 934	330	312.7	105.5	95.7	116.4	▲	2 191	98	111.4	88.0	72.6	106.7	▽
肥満者	1 934	1 145	998.7	114.6	110.5	119.0	▲▲	2 191	587	524.8	111.9	104.4	119.8	▲▲
高血圧症有病者	1 948	986	915.6	107.7	103.1	112.5	▲▲	2 197	877	832.5	105.3	100.1	110.9	▲▲
高血圧症予備群	1 948	242	233.1	103.8	92.3	116.8	▲	2 197	280	251.0	111.5	100.0	124.4	▲▲
脂質異常症有病者	1 945	1 244	1157.0	107.5	104.0	111.2	▲▲	2 200	1 380	1296.7	106.4	103.1	109.9	▲▲
糖尿病有病者	1 921	369	296.5	124.5	113.6	136.4	▲▲	2 184	185	174.0	106.3	92.7	122.0	▲
糖尿病予備群	1 921	212	275.9	76.8	67.7	87.2	▽▽	2 184	197	267.8	73.6	64.4	84.0	▽▽
習慣的喫煙者	1 995	650	590.0	110.2	103.4	117.3	▲▲	2 249	314	159.0	197.5	178.3	218.7	▲▲

伊東市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 248	1 518	1421.5	106.8	102.4	111.4	▲▲	5 918	471	549.3	85.8	78.7	93.4	▽▽
メタボ予備群	5 248	894	844.6	105.9	99.8	112.3	▲	5 918	297	300.6	98.8	88.5	110.3	▽
肥満者	5 248	2 873	2714.2	105.9	103.3	108.5	▲▲	5 917	1 356	1422.4	95.3	91.0	99.8	▽▽
高血圧症有病者	5 274	2 696	2555.6	105.5	102.8	108.3	▲▲	5 951	2 333	2310.6	101.0	97.9	104.2	▲
高血圧症予備群	5 274	693	626.9	110.5	103.2	118.4	▲▲	5 951	749	686.9	109.0	102.1	116.5	▲▲
脂質異常症有病者	5 267	3 308	3136.9	105.5	103.3	107.7	▲▲	5 950	3 637	3539.6	102.8	100.7	104.8	▲▲
糖尿病有病者	5 168	864	818.4	105.6	99.4	112.1	▲	5 819	493	475.7	103.6	95.4	112.7	▲
糖尿病予備群	5 168	629	748.8	84.0	78.1	90.3	▽▽	5 819	508	725.0	70.1	64.5	76.1	▽▽
習慣的喫煙者	5 393	1 675	1540.6	108.7	104.5	113.1	▲▲	6 078	819	418.6	195.7	183.8	208.3	▲▲

沼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	15 893	4 166	3938.6	105.8	103.1	108.5	▲▲	14 634	1 207	1156.9	104.3	99.0	110.0	▲
メタボ予備群	15 893	2 885	2605.5	110.7	107.2	114.3	▲▲	14 634	876	732.8	119.5	112.3	127.2	▲▲
肥満者	15 893	8 903	8136.3	109.4	108.0	110.9	▲▲	14 634	3 720	3427.7	108.5	105.6	111.5	▲▲
高血圧症有病者	16 003	6 850	6798.8	100.8	99.0	102.5	▲	14 700	4 656	4758.5	97.8	95.6	100.1	▽
高血圧症予備群	16 003	1 747	1938.5	90.1	86.3	94.1	▽▽	14 700	1 286	1567.6	82.0	78.0	86.3	▽▽
脂質異常症有病者	15 941	9 375	9386.4	99.9	98.6	101.2	▽	14 692	7 886	7908.0	99.7	98.3	101.2	▽
糖尿病有病者	15 761	2 283	2180.0	104.7	100.9	108.7	▲▲	14 460	900	982.5	91.6	86.1	97.4	▽▽
糖尿病予備群	15 761	1 842	2128.7	86.5	83.0	90.2	▽▽	14 460	1 205	1567.8	76.9	72.9	81.0	▽▽
習慣的喫煙者	16 403	5 724	5237.7	109.3	107.1	111.5	▲▲	15 122	1 587	1244.1	127.6	121.9	133.4	▲▲

三島市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 350	2 235	2078.5	107.5	103.8	111.4	▲▲	8 315	681	662.0	102.9	95.8	110.4	▲
メタボ予備群	8 350	1 412	1366.3	103.3	98.6	108.3	▲	8 315	392	415.8	94.3	85.7	103.7	▽
肥満者	8 350	4 431	4273.4	103.7	101.6	105.8	▲▲	8 315	1 958	1948.7	100.5	96.7	104.4	▲
高血圧症有病者	8 398	3 659	3598.1	101.7	99.3	104.2	▲	8 350	2 723	2724.7	99.9	96.9	103.0	▽
高血圧症予備群	8 398	1 074	1015.4	105.8	100.1	111.8	▲▲	8 350	1 017	892.7	113.9	107.6	120.6	▲▲
脂質異常症有病者	8 376	5 106	4930.3	103.6	101.8	105.3	▲▲	8 345	4 642	4504.1	103.1	101.1	105.0	▲▲
糖尿病有病者	8 244	1 212	1150.7	105.3	100.1	110.9	▲▲	8 123	603	559.0	107.9	100.0	116.3	▲▲
糖尿病予備群	8 244	1 050	1115.7	94.1	89.0	99.5	▽▽	8 123	738	887.9	83.1	77.7	89.0	▽▽
習慣的喫煙者	8 554	2 691	2702.2	99.6	96.6	102.7	▽	8 556	763	697.7	109.4	102.3	116.9	▲▲

裾野市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 910	996	981.7	101.5	96.2	107.0	▲	3 724	345	307.0	112.4	101.7	124.2	▲▲
メタボ予備群	3 910	741	636.7	116.4	109.1	124.1	▲▲	3 724	225	185.7	121.2	106.9	137.4	▲▲
肥満者	3 910	2 118	1998.9	106.0	103.0	109.0	▲▲	3 724	1 061	876.0	121.1	115.2	127.4	▲▲
高血圧症有病者	3 930	1 711	1712.5	99.9	96.4	103.5	▽	3 738	1 382	1269.4	108.9	104.4	113.5	▲▲
高血圧症予備群	3 930	518	472.4	109.7	101.3	118.8	▲▲	3 738	400	406.0	98.5	89.9	108.0	▽
脂質異常症有病者	3 922	2 373	2305.8	102.9	100.4	105.5	▲▲	3 744	2 176	2055.5	105.9	103.0	108.8	▲▲
糖尿病有病者	3 883	487	551.2	88.4	81.4	96.0	▽▽	3 701	251	264.0	95.1	84.4	107.0	▽
糖尿病予備群	3 883	444	526.6	84.3	77.3	92.0	▽▽	3 701	305	414.4	73.6	66.1	81.9	▽▽
習慣的喫煙者	4 001	1 347	1237.2	108.9	104.3	113.7	▲▲	3 827	323	300.6	107.5	96.9	119.2	▲

伊豆市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低い有意でない、▲ 高い有意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 826	809	742.4	109.0	102.8	115.5	▲▲	2 861	303	252.1	120.2	108.1	133.6	▲▲
メタボ予備群	2 826	483	457.2	105.6	97.4	114.5	▲	2 861	136	144.7	94.0	79.9	110.7	▽
肥満者	2 826	1 539	1455.6	105.7	102.2	109.3	▲▲	2 861	827	680.7	121.5	114.7	128.6	▲▲
高血圧症有病者	2 855	1 607	1321.8	121.6	117.7	125.6	▲▲	2 872	1 295	1045.2	123.9	119.0	129.0	▲▲
高血圧症予備群	2 855	323	342.0	94.4	85.3	104.6	▽	2 872	336	324.2	103.7	93.8	114.5	▲
脂質異常症有病者	2 837	1 699	1683.2	100.9	98.0	104.0	▲	2 876	1 711	1663.0	102.9	99.8	106.0	▲
糖尿病有病者	2 831	486	429.5	113.2	104.4	122.6	▲▲	2 853	280	218.3	128.3	114.9	143.2	▲▲
糖尿病予備群	2 831	346	402.5	86.0	77.9	94.9	▽▽	2 853	309	340.4	90.8	81.8	100.8	▽
習慣的喫煙者	2 922	965	875.0	110.3	104.8	116.1	▲▲	2 955	265	216.9	122.2	109.0	137.0	▲▲

伊豆の国市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4 131	1 210	1043.6	115.9	110.6	121.5	▲▲	4 086	404	336.1	120.2	109.7	131.7	▲▲
メタボ予備群	4 131	701	674.7	103.9	97.2	111.1	▲	4 086	201	204.9	98.1	85.8	112.1	▽
肥満者	4 129	2 308	2118.3	109.0	106.1	111.9	▲▲	4 086	1 068	962.1	111.0	105.5	116.8	▲▲
高血圧症有病者	4 160	2 013	1819.4	110.6	107.2	114.1	▲▲	4 093	1 601	1384.3	115.7	111.4	120.1	▲▲
高血圧症予備群	4 160	490	501.9	97.6	89.9	106.0	▽	4 093	398	444.6	89.5	81.6	98.2	▽▽
脂質異常症有病者	4 147	2 520	2447.2	103.0	100.5	105.5	▲▲	4 099	2 345	2259.1	103.8	101.1	106.6	▲▲
糖尿病有病者	4 120	640	587.0	109.0	101.6	117.0	▲▲	4 044	286	287.4	99.5	89.1	111.2	▽
糖尿病予備群	4 120	496	564.3	87.9	81.0	95.4	▽▽	4 044	399	453.5	88.0	80.2	96.5	▽▽
習慣的喫煙者	4 267	1 421	1329.6	106.9	102.5	111.5	▲▲	4 202	464	331.7	139.9	128.5	152.3	▲▲

函南町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 800	752	681.1	110.4	103.9	117.3	▲▲	2 540	204	199.3	102.4	89.8	116.7	▲
メタボ予備群	2 800	494	459.4	107.5	99.3	116.4	▲	2 540	139	127.1	109.3	93.1	128.4	▲
肥満者	2 800	1 545	1427.9	108.2	104.7	111.9	▲▲	2 540	647	594.6	108.8	101.8	116.3	▲▲
高血圧症有病者	2 828	1 241	1173.3	105.8	101.5	110.3	▲▲	2 549	886	819.1	108.2	102.6	114.0	▲▲
高血圧症予備群	2 828	372	342.7	108.6	98.8	119.3	▲	2 549	303	270.8	111.9	100.7	124.3	▲▲
脂質異常症有病者	2 812	1 703	1649.1	103.3	100.2	106.4	▲▲	2 555	1 386	1366.5	101.4	97.9	105.1	▲
糖尿病有病者	2 780	405	374.5	108.1	98.9	118.3	▲	2 509	154	169.0	91.1	78.2	106.1	▽
糖尿病予備群	2 780	363	368.5	98.5	89.5	108.4	▽	2 509	229	269.8	84.9	75.1	96.0	▽▽
習慣的喫煙者	2 906	1 006	937.9	107.3	102.1	112.7	▲▲	2 637	271	218.7	123.9	110.8	138.6	▲▲

清水町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 544	674	611.8	110.2	103.3	117.5	▲▲	2 343	197	178.5	110.3	96.6	126.0	▲
メタボ予備群	2 544	436	419.2	104.0	95.5	113.2	▲	2 343	163	116.8	139.5	120.4	161.7	▲▲
肥満者	2 544	1 435	1297.5	110.6	106.9	114.4	▲▲	2 343	620	545.8	113.6	106.2	121.5	▲▲
高血圧症有病者	2 558	1 052	1038.7	101.3	96.7	106.1	▲	2 352	751	731.7	102.6	96.8	108.8	▲
高血圧症予備群	2 558	322	311.5	103.4	93.4	114.4	▲	2 352	265	245.6	107.9	96.4	120.8	▲
脂質異常症有病者	2 553	1 501	1496.8	100.3	97.1	103.6	▲	2 354	1 229	1236.7	99.4	95.6	103.3	▽
糖尿病有病者	2 527	345	333.5	103.5	93.8	114.1	▲	2 325	140	151.3	92.5	78.8	108.6	▽
糖尿病予備群	2 527	292	332.9	87.7	78.8	97.7	▽▽	2 325	174	243.2	71.5	62.0	82.5	▽▽
習慣的喫煙者	2 615	882	860.9	102.5	97.1	108.1	▲	2 415	234	204.5	114.4	101.4	129.2	▲▲

長泉町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	3 133	795	760.0	104.6	98.5	111.1	▲	2 931	225	222.1	101.3	89.4	114.8	▲
メタボ予備群	3 133	540	514.5	105.0	97.2	113.3	▲	2 931	123	145.2	84.7	71.3	100.6	▽
肥満者	3 133	1 688	1597.0	105.7	102.3	109.2	▲▲	2 931	683	681.2	100.3	93.9	107.0	▲
高血圧症有病者	3 149	1 261	1301.3	96.9	92.9	101.1	▽	2 944	879	910.1	96.6	91.4	102.1	▽
高血圧症予備群	3 149	413	381.7	108.2	98.9	118.3	▲	2 944	344	307.0	112.1	101.5	123.7	▲▲
脂質異常症有病者	3 143	1 862	1841.4	101.1	98.2	104.1	▲	2 943	1 553	1533.5	101.3	97.9	104.8	▲
糖尿病有病者	3 111	389	417.6	93.1	84.9	102.2	▽	2 889	181	187.9	96.3	83.7	110.9	▽
糖尿病予備群	3 111	379	410.9	92.2	84.0	101.3	▽	2 889	216	301.6	71.6	63.0	81.4	▽▽
習慣的喫煙者	3 215	1 084	1037.2	104.5	99.6	109.7	▲	3 027	250	257.8	97.0	86.2	109.1	▽

御殿場市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	6 270	1 803	1581.8	114.0	109.7	118.5	▲▲	6 325	592	515.8	114.8	106.4	123.8	▲▲
メタボ予備群	6 270	1 065	1021.3	104.3	98.8	110.1	▲	6 325	404	316.4	127.7	116.3	140.1	▲▲
肥満者	6 270	3 473	3210.2	108.2	105.8	110.6	▲▲	6 325	1 794	1486.6	120.7	116.1	125.4	▲▲
高血圧症有病者	6 318	3 045	2766.3	110.1	107.3	112.9	▲▲	6 351	2 424	2125.5	114.0	110.6	117.6	▲▲
高血圧症予備群	6 318	752	760.6	98.9	92.5	105.7	▽	6 351	766	688.4	111.3	104.2	118.8	▲▲
脂質異常症有病者	6 296	3 946	3709.4	106.4	104.4	108.4	▲▲	6 350	3 633	3477.1	104.5	102.3	106.7	▲▲
糖尿病有病者	6 144	962	880.4	109.3	103.2	115.7	▲▲	6 253	480	440.2	109.0	100.2	118.7	▲▲
糖尿病予備群	6 144	766	841.7	91.0	85.2	97.2	▽▽	6 253	561	696.2	80.6	74.5	87.1	▽▽
習慣的喫煙者	6 443	2 304	2000.1	115.2	111.5	119.0	▲▲	6 517	723	518.6	139.4	130.3	149.2	▲▲

小山町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	1 334	403	353.0	114.2	105.2	123.8	▲▲	1 453	132	127.8	103.3	87.8	121.5	▲
メタボ予備群	1 334	214	215.3	99.4	87.9	112.3	▽	1 453	98	73.2	133.8	110.6	161.9	▲▲
肥満者	1 334	751	687.3	109.3	104.2	114.6	▲▲	1 453	419	345.2	121.4	112.0	131.5	▲▲
高血圧症有病者	1 347	662	631.7	104.8	99.3	110.6	▲	1 457	566	529.4	106.9	100.3	114.0	▲▲
高血圧症予備群	1 347	187	160.8	116.3	101.8	132.8	▲▲	1 457	182	164.0	111.0	96.9	127.1	▲
脂質異常症有病者	1 338	842	793.5	106.1	101.8	110.6	▲▲	1 456	887	838.9	105.7	101.5	110.2	▲▲
糖尿病有病者	1 320	214	203.1	105.4	93.2	119.1	▲	1 436	110	110.0	100.0	83.6	119.6	▲
糖尿病予備群	1 320	172	188.0	91.5	79.6	105.1	▽	1 436	112	171.2	65.4	54.8	78.1	▽▽
習慣的喫煙者	1 370	440	402.1	109.4	101.3	118.2	▲▲	1 486	131	108.8	120.4	102.3	141.7	▲▲

富士宮市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	11 561	2 945	2830.4	104.0	100.9	107.3	▲▲	10 523	875	809.8	108.0	101.5	115.0	▲▲
メタボ予備群	11 561	2 003	1897.3	105.6	101.5	109.8	▲▲	10 523	571	524.9	108.8	100.6	117.6	▲▲
肥満者	11 561	6 119	5905.2	103.6	101.9	105.4	▲▲	10 523	2 670	2452.8	108.9	105.4	112.4	▲▲
高血圧症有病者	11 661	5 177	4876.9	106.2	104.1	108.3	▲▲	10 579	3 558	3313.2	107.4	104.6	110.2	▲▲
高血圧症予備群	11 661	1 490	1413.6	105.4	100.6	110.4	▲▲	10 579	1 279	1114.4	114.8	109.1	120.7	▲▲
脂質異常症有病者	11 599	6 847	6811.5	100.5	99.0	102.0	▲	10 568	5 727	5593.2	102.4	100.6	104.2	▲▲
糖尿病有病者	11 503	1 545	1565.2	98.7	94.3	103.3	▽	10 447	688	686.2	100.3	93.4	107.6	▲
糖尿病予備群	11 503	1 421	1536.2	92.5	88.2	97.0	▽▽	10 447	930	1106.1	84.1	79.2	89.3	▽▽
習慣的喫煙者	11 930	4 295	3839.1	111.9	109.3	114.5	▲▲	10 893	1 248	916.6	136.2	129.4	143.3	▲▲

富士市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	21 598	5 519	5241.0	105.3	103.0	107.6	▲▲	18 265	1 498	1364.6	109.8	104.8	115.0	▲▲
メタボ予備群	21 598	3 700	3553.6	104.1	101.2	107.1	▲▲	18 265	998	910.1	109.7	103.5	116.2	▲▲
肥満者	21 598	11 458	11027.5	103.9	102.7	105.2	▲▲	18 265	4 567	4240.9	107.7	105.1	110.3	▲▲
高血圧症有病者	21 750	9 428	8960.8	105.2	103.7	106.8	▲▲	18 353	5 938	5560.7	106.8	104.6	109.0	▲▲
高血圧症予備群	21 750	2 853	2644.3	107.9	104.4	111.5	▲▲	18 353	1 994	1906.2	104.6	100.5	108.9	▲▲
脂質異常症有病者	21 674	13 188	12722.0	103.7	102.6	104.7	▲▲	18 337	9 777	9546.7	102.4	101.1	103.8	▲▲
糖尿病有病者	21 278	2 838	2853.3	99.5	96.2	102.8	▽	17 890	1 075	1140.3	94.3	89.1	99.7	▽▽
糖尿病予備群	21 278	2 484	2827.1	87.9	84.8	91.1	▽▽	17 890	1 519	1853.6	81.9	78.2	85.9	▽▽
習慣的喫煙者	22 273	8 231	7259.6	113.4	111.5	115.3	▲▲	18 891	2 116	1630.4	129.8	124.9	134.9	▲▲

島田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9 966	2 251	2453.1	91.8	88.5	95.1	▽▽	8 673	542	675.6	80.2	74.0	87.0	▽▽
メタボ予備群	9 966	1 531	1631.7	93.8	89.7	98.2	▽▽	8 673	367	433.0	84.8	76.8	93.6	▽▽
肥満者	9 966	4 720	5090.1	92.7	90.9	94.6	▽▽	8 673	1 656	2024.2	81.8	78.4	85.4	▽▽
高血圧症有病者	10 023	4 060	4228.9	96.0	93.8	98.3	▽▽	8 690	2 501	2755.2	90.8	87.9	93.8	▽▽
高血圧症予備群	10 023	1 323	1212.9	109.1	103.8	114.6	▲▲	8 690	928	921.0	100.8	94.9	107.0	▲
脂質異常症有病者	10 005	5 683	5877.9	96.7	95.1	98.3	▽▽	8 706	4 519	4647.1	97.2	95.3	99.2	▽▽
糖尿病有病者	9 908	1 324	1361.0	97.3	92.6	102.2	▽	8 577	518	572.0	90.6	83.4	98.3	▽▽
糖尿病予備群	9 908	1 429	1330.5	107.4	102.5	112.6	▲▲	8 577	1 145	919.9	124.5	118.1	131.2	▲▲
習慣的喫煙者	10 249	3 206	3279.3	97.8	95.0	100.6	▽	8 919	558	741.0	75.3	69.6	81.5	▽▽

焼津市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	13 796	3 361	3355.7	100.2	97.3	103.1	▲	11 881	938	922.3	101.7	95.8	108.0	▲		
メタボ予備群	13 796	2 262	2266.8	99.8	96.2	103.5	▽	11 881	518	593.0	87.4	80.4	94.9	▽▽		
肥満者	13 796	6 934	7041.6	98.5	96.9	100.1	▽	11 881	2 693	2772.7	97.1	94.0	100.3	▽		
高血圧症有病者	13 852	5 944	5740.9	103.5	101.6	105.5	▲▲	11 912	4 024	3771.4	106.7	104.1	109.4	▲▲		
高血圧症予備群	13 852	1 899	1681.3	112.9	108.4	117.7	▲▲	11 912	1 404	1259.0	111.5	106.3	117.0	▲▲		
脂質異常症有病者	13 851	7 752	8129.7	95.4	94.0	96.7	▽▽	11 937	5 957	6354.9	93.7	92.1	95.4	▽▽		
糖尿病有病者	13 557	1 851	1829.0	101.2	97.1	105.5	▲	11 621	849	775.3	109.5	102.8	116.7	▲▲		
糖尿病予備群	13 557	1 907	1804.5	105.7	101.5	110.1	▲▲	11 621	1 797	1244.0	144.5	138.6	150.5	▲▲		
習慣的喫煙者	14 305	4 869	4637.1	105.0	102.7	107.4	▲▲	12 357	1 032	1031.6	100.0	94.5	105.9	▲		

藤枝市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	13 928	3 065	3403.4	90.1	87.3	92.9	▽▽	12 295	561	936.9	59.9	55.3	64.9	▽▽
メタボ予備群	13 928	2 145	2282.4	94.0	90.5	97.6	▽▽	12 295	374	611.4	61.2	55.4	67.5	▽▽
肥満者	13 928	6 550	7104.7	92.2	90.6	93.8	▽▽	12 294	2 292	2859.0	80.2	77.3	83.1	▽▽
高血圧症有病者	13 983	5 892	5848.1	100.8	98.9	102.7	▲	12 326	3 990	3819.0	104.5	101.9	107.1	▲▲
高血圧症予備群	13 983	1 939	1692.4	114.6	110.0	119.3	▲▲	12 326	1 396	1292.0	108.1	103.0	113.4	▲▲
脂質異常症有病者	13 998	7 891	8212.0	96.1	94.7	97.5	▽▽	12 347	6 250	6489.9	96.3	94.7	98.0	▽▽
糖尿病有病者	13 704	1 719	1865.5	92.1	88.2	96.2	▽▽	12 085	670	787.2	85.1	79.2	91.5	▽▽
糖尿病予備群	13 704	1 715	1827.2	93.9	89.9	98.0	▽▽	12 085	1 120	1270.7	88.1	83.4	93.1	▽▽
習慣的喫煙者	14 387	4 356	4616.3	94.4	92.1	96.7	▽▽	12 763	848	1080.9	78.5	73.6	83.6	▽▽

牧之原市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	3 967	990	995.6	99.4	94.2	104.9	▽	3 517	256	283.0	90.5	80.5	101.7	▽		
メタボ予備群	3 967	611	647.0	94.4	87.8	101.5	▽	3 517	132	176.3	74.9	63.4	88.4	▽▽		
肥満者	3 967	1 986	2031.0	97.8	94.8	100.9	▽	3 517	733	824.4	88.9	83.4	94.8	▽▽		
高血圧症有病者	4 031	1 789	1754.4	102.0	98.5	105.5	▲	3 558	1 243	1171.2	106.1	101.5	111.0	▲▲		
高血圧症予備群	4 031	554	486.0	114.0	105.6	123.1	▲▲	3 558	420	384.4	109.3	99.9	119.5	▲		
脂質異常症有病者	4 024	2 349	2372.5	99.0	96.5	101.6	▽	3 555	1 875	1946.6	96.3	93.4	99.3	▽▽		
糖尿病有病者	3 990	571	567.9	100.6	93.2	108.4	▲	3 473	282	241.3	116.9	104.6	130.6	▲▲		
糖尿病予備群	3 990	675	547.3	123.3	115.2	132.1	▲▲	3 473	715	385.5	185.5	173.8	197.8	▲▲		
習慣的喫煙者	4 150	1 426	1302.0	109.5	105.0	114.2	▲▲	3 660	284	293.9	96.6	86.5	108.0	▽		

吉田町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 748	684	667.1	102.5	96.1	109.4	▲	2 246	162	166.1	97.5	84.1	113.1	▽
メタボ予備群	2 748	403	451.4	89.3	81.6	97.7	▽▽	2 246	89	111.4	79.9	65.2	97.9	▽▽
肥満者	2 748	1 344	1401.8	95.9	92.3	99.6	▽▽	2 246	507	519.6	97.6	90.4	105.3	▽
高血圧症有病者	2 765	1 159	1143.6	101.3	97.0	105.9	▲	2 252	643	671.9	95.7	89.7	102.1	▽
高血圧症予備群	2 765	394	335.6	117.4	107.2	128.6	▲▲	2 252	265	232.7	113.9	101.8	127.5	▲▲
脂質異常症有病者	2 761	1 577	1620.0	97.3	94.3	100.5	▽	2 252	1 152	1167.0	98.7	94.8	102.8	▽
糖尿病有病者	2 712	427	365.2	116.9	107.2	127.5	▲▲	2 201	148	138.5	106.9	91.5	124.8	▲
糖尿病予備群	2 712	408	361.2	113.0	103.3	123.5	▲▲	2 201	347	226.4	153.3	139.3	168.7	▲▲
習慣的喫煙者	2 850	1 033	926.0	111.6	106.3	117.1	▲▲	2 327	234	201.9	115.9	102.7	130.8	▲▲

川根本町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	751	194	199.7	97.1	86.1	109.6	▽	645	51	57.7	88.4	67.9	115.0	▽
メタボ予備群	751	102	121.5	83.9	70.1	100.5	▽	645	29	32.9	88.2	61.8	125.8	▽
肥満者	751	358	388.0	92.3	85.6	99.4	▽▽	645	144	154.1	93.5	80.9	107.9	▽
高血圧症有病者	759	387	356.8	108.5	101.2	116.3	▲▲	645	258	238.3	108.3	98.5	119.0	▲
高血圧症予備群	759	117	90.9	128.7	109.0	152.0	▲▲	645	79	73.2	107.9	87.8	132.7	▲
脂質異常症有病者	753	397	448.2	88.6	82.8	94.8	▽▽	646	331	379.5	87.2	80.9	94.0	▽▽
糖尿病有病者	742	118	114.6	103.0	87.3	121.5	▲	632	70	49.4	141.7	113.6	176.6	▲▲
糖尿病予備群	742	127	107.0	118.7	101.3	139.0	▲▲	632	132	76.8	171.8	147.6	199.9	▲▲
習慣的喫煙者	772	237	229.1	103.4	93.1	115.0	▲	651	37	46.9	78.9	57.7	107.9	▽

磐田市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	16 836	3 765	4090.9	92.0	89.5	94.6	▽▽	14 604	1 133	1113.1	101.8	96.4	107.5	▲
メタボ予備群	16 836	2 661	2761.8	96.4	93.1	99.7	▽▽	14 604	736	725.5	101.4	94.7	108.6	▲
肥満者	16 836	8 208	8582.3	95.6	94.2	97.1	▽▽	14 603	3 329	3395.1	98.1	95.2	100.9	▽
高血圧症有病者	16 923	6 384	7006.9	91.1	89.4	92.8	▽▽	14 660	4 094	4543.5	90.1	87.8	92.4	▽▽
高血圧症予備群	16 923	1 949	2051.0	95.0	91.2	99.0	▽▽	14 660	1 542	1535.9	100.4	95.9	105.1	▲
脂質異常症有病者	16 886	9 795	9898.7	99.0	97.7	100.2	▽	14 657	7 854	7700.0	102.0	100.5	103.5	▲▲
糖尿病有病者	16 705	2 186	2250.4	97.1	93.5	100.9	▽	14 459	1 045	940.3	111.1	105.0	117.6	▲▲
糖尿病予備群	16 705	2 410	2215.2	108.8	105.0	112.8	▲▲	14 459	1 625	1517.2	107.1	102.4	112.0	▲▲
習慣的喫煙者	17 246	5 281	5568.4	94.8	92.8	96.9	▽▽	14 964	904	1262.4	71.6	67.3	76.2	▽▽

掛川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性						女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9 600	2 124	2363.8	89.9	86.6	93.2	▽▽	8 917	608	695.0	87.5	81.1	94.4	▽▽
メタボ予備群	9 600	1 449	1569.0	92.3	88.1	96.8	▽▽	8 917	396	444.1	89.2	81.1	98.0	▽▽
肥満者	9 599	4 503	4897.3	91.9	90.0	93.9	▽▽	8 917	1 896	2078.8	91.2	87.7	94.9	▽▽
高血圧症有病者	9 658	3 869	4083.1	94.8	92.5	97.1	▽▽	8 949	2 580	2836.6	91.0	88.1	93.9	▽▽
高血圧症予備群	9 658	1 197	1166.7	102.6	97.4	108.1	▲	8 949	1 007	949.1	106.1	100.2	112.3	▲▲
脂質異常症有病者	9 622	5 498	5647.0	97.4	95.7	99.0	▽▽	8 942	4 681	4774.7	98.0	96.1	100.0	▽▽
糖尿病有病者	9 536	1 226	1313.4	93.3	88.7	98.3	▽▽	8 813	566	586.7	96.5	89.2	104.4	▽
糖尿病予備群	9 536	1 300	1278.5	101.7	96.7	106.9	▲	8 813	934	944.5	98.9	93.2	105.0	▽
習慣的喫煙者	9 857	3 031	3137.4	96.6	93.8	99.5	▽▽	9 145	578	757.3	76.3	70.6	82.5	▽▽

袋井市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	7 899	1 810	1944.1	93.1	89.5	96.9	▽▽	6 751	531	526.4	100.9	93.1	109.4	▲
メタボ予備群	7 899	1 236	1291.2	95.7	91.0	100.7	▽	6 751	357	335.2	106.5	96.4	117.7	▲
肥満者	7 899	3 847	4029.7	95.5	93.4	97.6	▽▽	6 751	1 575	1573.8	100.1	95.9	104.4	▲
高血圧症有病者	7 936	3 031	3354.6	90.4	87.9	92.9	▽▽	6 770	2 028	2151.3	94.3	90.9	97.7	▽▽
高血圧症予備群	7 936	977	958.2	102.0	96.2	108.0	▲	6 770	795	716.9	110.9	104.0	118.3	▲▲
脂質異常症有病者	7 921	4 474	4647.7	96.3	94.4	98.1	▽▽	6 767	3 540	3595.7	98.5	96.3	100.7	▽
糖尿病有病者	7 843	1 105	1079.8	102.3	97.0	108.0	▲	6 696	508	446.6	113.7	104.7	123.5	▲▲
糖尿病予備群	7 843	1 166	1050.2	111.0	105.4	117.0	▲▲	6 696	753	715.0	105.3	98.5	112.6	▲
習慣的喫煙者	8 081	2 528	2567.9	98.4	95.4	101.6	▽	6 916	475	571.8	83.1	76.2	90.5	▽▽

御前崎市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	2 660	676	680.8	99.3	93.1	105.9	▽	2 661	203	222.7	91.1	79.9	104.0	▽		
メタボ予備群	2 660	426	432.4	98.5	90.3	107.4	▽	2 661	133	133.7	99.5	84.4	117.3	▽		
肥満者	2 660	1 339	1365.0	98.1	94.5	101.9	▽	2 660	641	627.3	102.2	95.5	109.3	▲		
高血圧症有病者	2 675	1 157	1194.6	96.9	92.8	101.1	▽	2 674	945	919.5	102.8	97.7	108.2	▲		
高血圧症予備群	2 675	405	321.4	126.0	115.2	137.8	▲▲	2 674	369	293.4	125.8	114.5	138.2	▲▲		
脂質異常症有病者	2 672	1 607	1578.4	101.8	98.7	105.0	▲	2 669	1 467	1492.8	98.3	95.0	101.7	▽		
糖尿病有病者	2 620	395	382.1	103.4	94.4	113.2	▲	2 580	217	188.8	114.9	101.3	130.4	▲▲		
糖尿病予備群	2 620	413	362.8	113.9	104.3	124.3	▲▲	2 580	388	297.1	130.6	119.2	143.1	▲▲		
習慣的喫煙者	2 732	916	835.2	109.7	104.1	115.6	▲▲	2 731	219	211.2	103.7	91.4	117.7	▲		

菊川市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	4 126	892	1024.3	87.1	82.2	92.3	▽▽	3 874	284	301.6	94.2	84.3	105.2	▽
メタボ予備群	4 126	644	672.4	95.8	89.3	102.8	▽	3 874	191	192.2	99.4	86.6	114.0	▽
肥満者	4 126	1 923	2105.1	91.4	88.4	94.4	▽▽	3 874	871	902.4	96.5	91.1	102.3	▽
高血圧症有病者	4 147	1 690	1777.8	95.1	91.7	98.6	▽▽	3 883	1 216	1229.8	98.9	94.4	103.6	▽
高血圧症予備群	4 147	481	499.3	96.3	88.6	104.7	▽	3 883	462	411.0	112.4	103.2	122.4	▲▲
脂質異常症有病者	4 141	2 362	2430.2	97.2	94.7	99.8	▽▽	3 886	2 009	2064.6	97.3	94.4	100.3	▽
糖尿病有病者	4 097	524	572.6	91.5	84.5	99.1	▽▽	3 841	224	255.8	87.6	77.2	99.3	▽▽
糖尿病予備群	4 097	544	551.3	98.7	91.3	106.7	▽	3 841	374	410.5	91.1	82.8	100.3	▽
習慣的喫煙者	4 232	1 375	1327.9	103.6	99.2	108.1	▲	3 972	266	328.6	80.9	72.1	90.9	▽▽

森町



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	1 663	362	428.1	84.6	77.2	92.6	▽▽	1 566	119	126.1	94.4	79.4	112.1	▽		
メタボ予備群	1 663	242	269.5	89.8	79.9	100.9	▽	1 566	62	78.4	79.1	62.0	100.9	▽		
肥満者	1 663	751	853.5	88.0	83.5	92.8	▽▽	1 566	348	366.4	95.0	86.6	104.2	▽		
高血圧症有病者	1 677	717	754.6	95.0	89.9	100.4	▽	1 568	458	512.5	89.4	82.8	96.5	▽▽		
高血圧症予備群	1 677	190	201.4	94.3	82.5	107.8	▽	1 568	158	169.3	93.3	80.5	108.2	▽		
脂質異常症有病者	1 669	975	987.1	98.8	94.9	102.8	▽	1 572	878	862.9	101.7	97.4	106.3	▲		
糖尿病有病者	1 647	245	243.1	100.8	89.8	113.1	▲	1 558	123	107.1	114.9	97.0	136.0	▲		
糖尿病予備群	1 647	320	231.2	138.4	125.5	152.7	▲▲	1 558	272	172.4	157.8	141.7	175.7	▲▲		
習慣的喫煙者	1 711	523	525.6	99.5	92.7	106.8	▽	1 608	102	128.9	79.1	65.6	95.5	▽▽		

湖西市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	5 451	1 305	1366.2	95.5	91.1	100.1	▽	5 123	412	415.2	99.2	90.5	108.8	▽
メタボ予備群	5 451	904	888.7	101.7	95.9	107.9	▲	5 123	250	256.0	97.7	86.6	110.1	▽
肥満者	5 451	2 750	2787.9	98.6	96.1	101.2	▽	5 123	1 294	1202.8	107.6	102.7	112.7	▲▲
高血圧症有病者	5 492	2 392	2383.7	100.3	97.4	103.4	▲	5 140	1 752	1710.4	102.4	98.6	106.4	▲
高血圧症予備群	5 492	686	661.2	103.8	96.8	111.2	▲	5 140	586	553.8	105.8	98.1	114.1	▲
脂質異常症有病者	5 460	3 089	3211.3	96.2	94.0	98.4	▽▽	5 131	2 834	2797.7	101.3	98.9	103.8	▲
糖尿病有病者	5 429	750	767.6	97.7	91.5	104.4	▽	5 090	415	355.6	116.7	106.5	127.9	▲▲
糖尿病予備群	5 429	738	737.4	100.1	93.6	107.0	▲	5 090	559	562.5	99.4	92.0	107.4	▽
習慣的喫煙者	5 585	1 690	1740.3	97.1	93.4	101.0	▽	5 264	358	421.6	84.9	76.9	93.8	▽▽

静岡市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	61 624	15 922	15148.0	105.1	103.5	106.8	▲▲	53 076	4 229	4014.8	105.3	102.2	108.6	▲▲		
メタボ予備群	61 624	9 958	10115.3	98.4	96.5	100.4	▽	53 076	2 627	2648.3	99.2	95.4	103.1	▽		
肥満者	61 622	31 740	31511.3	100.7	99.6	101.8	▲	53 067	12 208	12343.2	98.9	97.2	100.7	▽		
高血圧症有病者	62 140	28 096	26108.7	107.6	106.4	108.9	▲▲	53 364	17 147	16391.3	104.6	103.1	106.2	▲▲		
高血圧症予備群	62 140	7 799	7537.6	103.5	101.2	105.8	▲▲	53 364	5 541	5577.6	99.3	96.7	102.0	▽		
脂質異常症有病者	61 916	36 756	36411.8	100.9	99.9	102.0	▲	53 362	27 793	28011.1	99.2	98.1	100.4	▽		
糖尿病有病者	60 893	8 278	8329.3	99.4	97.3	101.5	▽	52 129	3 260	3366.3	96.8	93.5	100.2	▽		
糖尿病予備群	60 893	7 722	8174.5	94.5	92.4	96.6	▽▽	52 129	5 124	5456.7	93.9	91.3	96.5	▽▽		
習慣的喫煙者	63 686	20 428	20475.6	99.8	98.4	101.1	▽	55 083	4 811	4702.4	102.3	99.4	105.2	▲		

静岡市葵区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	21 792	5 442	5374.9	101.2	99.0	103.5	▲	18 892	1 441	1433.0	100.6	95.8	105.5	▲
メタボ予備群	21 792	3 477	3573.5	97.3	94.5	100.2	▽	18 892	917	943.1	97.2	91.5	103.4	▽
肥満者	21 791	11 018	11145.3	98.9	97.6	100.1	▽	18 890	4 215	4394.4	95.9	93.5	98.4	▽▽
高血圧症有病者	21 980	9 908	9283.3	106.7	105.2	108.2	▲▲	19 004	6 087	5849.8	104.1	102.0	106.2	▲▲
高血圧症予備群	21 980	2 823	2664.5	105.9	102.5	109.5	▲▲	19 004	2 027	1990.1	101.9	97.9	106.0	▲
脂質異常症有病者	21 920	12 930	12896.2	100.3	99.2	101.3	▲	19 011	9 844	10009.0	98.4	97.1	99.7	▽▽
糖尿病有病者	21 500	2 865	2958.4	96.8	93.7	100.1	▽	18 520	1 095	1199.4	91.3	86.3	96.5	▽▽
糖尿病予備群	21 500	2 560	2895.7	88.4	85.3	91.6	▽▽	18 520	1 697	1945.6	87.2	83.5	91.1	▽▽
習慣的喫煙者	22 542	6 968	7222.8	96.5	94.7	98.3	▽▽	19 617	1 562	1669.9	93.5	89.3	97.9	▽▽

静岡市駿河区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	17 491	4 522	4269.1	105.9	103.4	108.5	▲▲	14 931	1 100	1110.7	99.0	93.7	104.7	▽		
メタボ予備群	17 491	2 835	2873.7	98.7	95.5	101.9	▽	14 931	717	742.6	96.6	90.1	103.5	▽		
肥満者	17 491	9 005	8934.7	100.8	99.4	102.2	▲	14 929	3 330	3463.4	96.1	93.4	99.0	▽▽		
高血圧症有病者	17 645	7 835	7340.7	106.7	105.0	108.5	▲▲	15 004	4 554	4526.2	100.6	98.3	103.0	▲		
高血圧症予備群	17 645	2 186	2141.8	102.1	98.2	106.0	▲	15 004	1 461	1554.9	94.0	89.6	98.5	▽▽		
脂質異常症有病者	17 569	10 475	10318.8	101.5	100.3	102.7	▲▲	15 005	7 705	7777.0	99.1	97.6	100.6	▽		
糖尿病有病者	17 241	2 377	2333.9	101.8	98.2	105.6	▲	14 657	905	929.2	97.4	91.6	103.6	▽		
糖尿病予備群	17 241	2 186	2300.5	95.0	91.5	98.7	▽▽	14 657	1 427	1510.2	94.5	90.1	99.1	▽▽		
習慣的喫煙者	18 140	5 887	5872.4	100.2	98.2	102.3	▲	15 517	1 389	1343.9	103.4	98.4	108.5	▲		

静岡市清水区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	22 341	5 958	5504.0	108.2	106.0	110.5	▲▲	19 253	1 688	1471.2	114.7	109.8	119.9	▲▲		
メタボ予備群	22 341	3 646	3668.1	99.4	96.6	102.3	▽	19 253	993	962.6	103.2	97.3	109.4	▲		
肥満者	22 340	11 717	11431.2	102.5	101.3	103.7	▲▲	19 248	4 663	4485.4	104.0	101.5	106.5	▲▲		
高血圧症有病者	22 515	10 353	9484.7	109.2	107.7	110.7	▲▲	19 356	6 506	6015.4	108.2	106.1	110.2	▲▲		
高血圧症予備群	22 515	2 790	2731.4	102.1	98.8	105.6	▲	19 356	2 053	2032.6	101.0	97.1	105.1	▲		
脂質異常症有病者	22 427	13 351	13196.8	101.2	100.1	102.2	▲▲	19 346	10 244	10225.1	100.2	98.9	101.5	▲		
糖尿病有病者	22 152	3 036	3036.9	100.0	96.8	103.2	▽	18 952	1 260	1237.6	101.8	96.7	107.2	▲		
糖尿病予備群	22 152	2 976	2978.4	99.9	96.7	103.2	▽	18 952	2 000	2000.9	100.0	96.0	104.0	▽		
習慣的喫煙者	23 004	7 573	7380.4	102.6	100.8	104.5	▲▲	19 949	1 860	1688.6	110.2	105.7	114.8	▲▲		

浜松市



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	73 592	16 571	17655.3	93.9	92.4	95.3	▽▽	61 768	4 400	4438.7	99.1	96.2	102.1	▽		
メタボ予備群	73 592	11 922	12122.8	98.3	96.6	100.1	▽	61 768	3 129	3064.1	102.1	98.6	105.8	▲		
肥満者	73 592	36 595	37504.9	97.6	96.6	98.6	▽▽	61 768	13 879	14260.7	97.3	95.7	99.0	▽▽		
高血圧症有病者	74 016	26 946	30013.9	89.8	88.7	90.9	▽▽	62 001	16 018	17977.9	89.1	87.7	90.5	▽▽		
高血圧症予備群	74 016	7 581	9007.0	84.2	82.3	86.1	▽▽	62 001	5 289	6320.5	83.7	81.4	86.0	▽▽		
脂質異常症有病者	73 826	43 036	43252.5	99.5	98.6	100.4	▽	62 013	31 440	31491.0	99.8	98.7	100.9	▽		
糖尿病有病者	71 952	9 407	9491.4	99.1	97.1	101.1	▽	59 835	3 650	3651.5	100.0	96.7	103.3	▽		
糖尿病予備群	71 952	10 670	9470.2	112.7	110.5	114.8	▲▲	59 835	6 991	5996.2	116.6	113.9	119.4	▲▲		
習慣的喫煙者	75 633	22 205	24878.8	89.3	88.1	90.4	▽▽	63 749	4 377	5662.4	77.3	75.0	79.6	▽▽		

浜松市中区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	20 818	4 715	4988.6	94.5	92.2	96.8	▽▽	17 864	1 173	1256.5	93.4	88.5	98.5	▽▽
メタボ予備群	20 818	3 337	3433.4	97.2	94.3	100.2	▽	17 864	868	886.4	97.9	92.0	104.3	▽
肥満者	20 818	10 394	10615.5	97.9	96.6	99.2	▽▽	17 864	3 800	4114.8	92.4	89.9	94.9	▽▽
高血圧症有病者	20 941	7 431	8464.2	87.8	86.3	89.4	▽▽	17 931	4 225	5072.4	83.3	81.2	85.5	▽▽
高血圧症予備群	20 941	2 041	2552.2	80.0	76.8	83.2	▽▽	17 931	1 423	1810.9	78.6	74.9	82.5	▽▽
脂質異常症有病者	20 895	12 358	12248.5	100.9	99.8	102.0	▲	17 941	8 899	9008.3	98.8	97.4	100.2	▽
糖尿病有病者	20 414	2 763	2685.0	102.9	99.5	106.4	▲	17 366	963	1031.3	93.4	88.0	99.1	▽▽
糖尿病予備群	20 414	2 920	2689.7	108.6	105.1	112.1	▲▲	17 366	1 943	1708.5	113.7	109.2	118.4	▲▲
習慣的喫煙者	21 391	6 029	7072.9	85.2	83.5	87.0	▽▽	18 435	1 361	1665.4	81.7	77.8	85.9	▽▽

浜松市東区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性								女性							
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果		
					下限値	上限値						下限値	上限値			
メタボ該当者	11 754	2 592	2758.5	94.0	90.9	97.2	▽▽	9 208	620	640.6	96.8	89.8	104.3	▽		
メタボ予備群	11 754	1 914	1944.4	98.4	94.6	102.5	▽	9 208	423	454.6	93.1	84.9	102.0	▽		
肥満者	11 754	5 886	5975.5	98.5	96.8	100.3	▽	9 208	1 997	2116.4	94.4	90.8	98.0	▽▽		
高血圧症有病者	11 817	4 157	4636.0	89.7	87.5	91.9	▽▽	9 243	2 301	2589.7	88.9	85.8	92.0	▽▽		
高血圧症予備群	11 817	1 243	1443.1	86.1	81.8	90.7	▽▽	9 243	820	927.0	88.5	82.9	94.3	▽▽		
脂質異常症有病者	11 792	6 849	6887.3	99.4	98.0	101.0	▽	9 242	4 583	4589.1	99.9	97.9	101.9	▽		
糖尿病有病者	11 495	1 395	1463.2	95.3	90.8	100.1	▽	8 942	518	525.9	98.5	90.7	107.0	▽		
糖尿病予備群	11 495	1 667	1482.2	112.5	107.7	117.5	▲▲	8 942	1 016	868.9	116.9	110.5	123.8	▲▲		
習慣的喫煙者	12 104	3 718	4056.3	91.7	89.3	94.1	▽▽	9 527	688	866.7	79.4	73.9	85.2	▽▽		

浜松市西区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	10 868	2 426	2618.6	92.6	89.5	95.9	▽▽	9 426	720	675.2	106.6	99.5	114.3	▲
メタボ予備群	10 868	1 754	1790.7	98.0	93.9	102.2	▽	9 426	471	468.1	100.6	92.3	109.7	▲
肥満者	10 868	5 419	5544.7	97.7	95.9	99.6	▽▽	9 426	2 208	2177.1	101.4	97.8	105.1	▲
高血圧症有病者	10 930	3 939	4456.2	88.4	86.2	90.6	▽▽	9 479	2 482	2742.2	90.5	87.5	93.6	▽▽
高血圧症予備群	10 930	1 083	1330.0	81.4	77.0	86.1	▽▽	9 479	720	964.8	74.6	69.6	80.0	▽▽
脂質異常症有病者	10 903	6 296	6394.1	98.5	96.9	100.0	▽	9 471	4 783	4796.5	99.7	97.8	101.7	▽
糖尿病有病者	10 644	1 388	1410.7	98.4	93.8	103.3	▽	9 116	575	555.2	103.6	95.8	112.0	▲
糖尿病予備群	10 644	1 612	1405.1	114.7	109.8	119.9	▲▲	9 116	1 083	910.9	118.9	112.5	125.6	▲▲
習慣的喫煙者	11 143	3 154	3653.6	86.3	83.9	88.9	▽▽	9 736	605	870.0	69.5	64.4	75.0	▽▽

浜松市南区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意でない、▲ 高いが無意でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9 311	2 279	2233.0	102.1	98.5	105.7	▲	7 703	623	554.9	112.3	104.2	120.9	▲▲
メタボ予備群	9 311	1 618	1535.2	105.4	100.9	110.1	▲▲	7 703	428	382.4	111.9	102.2	122.6	▲▲
肥満者	9 311	4 898	4747.4	103.2	101.2	105.2	▲▲	7 703	1 893	1780.3	106.3	102.3	110.5	▲▲
高血圧症有病者	9 359	3 627	3791.0	95.7	93.3	98.1	▽▽	7 722	2 185	2250.2	97.1	93.8	100.6	▽
高血圧症予備群	9 359	993	1139.8	87.1	82.2	92.3	▽▽	7 722	682	787.2	86.6	80.7	93.0	▽▽
脂質異常症有病者	9 338	5 429	5472.6	99.2	97.5	100.9	▽	7 728	3 893	3924.9	99.2	97.0	101.4	▽
糖尿病有病者	9 184	1 244	1208.8	102.9	97.8	108.3	▲	7 533	490	460.3	106.4	97.8	115.8	▲
糖尿病予備群	9 184	1 456	1208.1	120.5	115.1	126.2	▲▲	7 533	996	753.7	132.1	124.8	139.9	▲▲
習慣的喫煙者	9 602	3 055	3163.9	96.6	93.8	99.4	▽▽	7 972	657	708.1	92.8	86.3	99.7	▽▽

浜松市北区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	8 347	1 831	2031.9	90.1	86.6	93.8	▽▽	7 267	528	539.7	97.8	90.2	106.1	▽
メタボ予備群	8 347	1 361	1368.6	99.4	94.8	104.3	▽	7 267	383	361.4	106.0	96.3	116.7	▲
肥満者	8 347	4 084	4255.7	96.0	93.9	98.1	▽▽	7 267	1 710	1683.6	101.6	97.5	105.8	▲
高血圧症有病者	8 401	3 147	3488.4	90.2	87.8	92.7	▽▽	7 291	1 961	2185.3	89.7	86.4	93.2	▽▽
高血圧症予備群	8 401	864	1017.9	84.9	79.7	90.4	▽▽	7 291	646	756.2	85.4	79.4	91.9	▽▽
脂質異常症有病者	8 374	4 869	4910.9	99.1	97.4	100.9	▽	7 294	3 809	3788.2	100.6	98.4	102.8	▲
糖尿病有病者	8 019	1 059	1087.9	97.3	92.1	102.9	▽	6 859	470	436.9	107.6	98.7	117.3	▲
糖尿病予備群	8 019	1 186	1069.0	110.9	105.3	116.8	▲▲	6 859	791	712.6	111.0	104.1	118.4	▲▲
習慣的喫煙者	8 580	2 521	2770.7	91.0	88.1	94.0	▽▽	7 478	447	646.0	69.2	63.3	75.6	▽▽

浜松市浜北区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。



なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	9 863	2 090	2339.0	89.4	86.1	92.8	▽▽	8 035	564	583.3	96.7	89.4	104.6	▽
メタボ予備群	9 863	1 541	1623.8	94.9	90.7	99.3	▽▽	8 035	437	396.2	110.3	100.8	120.7	▲▲
肥満者	9 863	4 663	5011.1	93.1	91.2	95.0	▽▽	8 035	1 762	1854.2	95.0	91.2	99.0	▽▽
高血圧症有病者	9 914	3 515	3965.8	88.6	86.3	91.0	▽▽	8 064	2 164	2369.4	91.3	88.1	94.6	▽▽
高血圧症予備群	9 914	1 054	1205.0	87.5	82.7	92.5	▽▽	8 064	770	824.1	93.4	87.4	99.8	▽▽
脂質異常症有病者	9 883	5 729	5771.2	99.3	97.6	100.9	▽	8 060	4 123	4095.4	100.7	98.6	102.8	▲
糖尿病有病者	9 632	1 165	1251.0	93.1	88.3	98.2	▽▽	7 816	496	484.2	102.4	94.2	111.4	▲
糖尿病予備群	9 632	1 443	1251.1	115.3	110.1	120.9	▲▲	7 816	869	788.1	110.3	103.7	117.3	▲▲
習慣的喫煙者	10 105	2 917	3335.3	87.5	84.9	90.1	▽▽	8 269	492	724.5	67.9	62.4	73.9	▽▽

浜松市天竜区



グラフ及び表の見方

標準化該当比は、静岡県（県内データ全体）の結果と当該市町の結果を比較した値である。静岡県（県内データ全体）を100（基準）としているため、当該市町の標準化該当比が100より大きい場合、当該市町の該当者出現割合は静岡県（県内データ全体）より高く、100より小さい場合、静岡県（県内データ全体）より低いことを示す。

なお、グラフ中の縦軸の大きさは、95%信頼区間を表し、表中の結果は、▽▽ 有意に低い、▽ 低いが無意味でない、▲ 高いが無意味でない、▲▲ 有意に高いを示す。

「有意に高い」とは、当該市町の標準化該当比が、偶然的な誤差を考慮しても、静岡県（県内データ全体）の結果（基準）と比べて十分に高いと考えられることを表す。

※ 異常値及び判定区分の設定は、「都道府県健康増進計画改定ガイドライン」の指標定義を使用した。（高血圧症有病者、脂質異常症有病者、糖尿病有病者には、服薬中の者を含む。）

項目	男性							女性						
	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果	判定可能者数	該当者数	期待者数	該当比	信頼区間		結果
					下限値	上限値						下限値	上限値	
メタボ該当者	2 631	638	685.8	93.0	87.0	99.5	▽▽	2 265	172	188.6	91.2	79.0	105.2	▽
メタボ予備群	2 631	397	426.6	93.1	85.0	101.9	▽	2 265	119	115.1	103.4	86.9	123.1	▲
肥満者	2 631	1 251	1355.0	92.3	88.7	96.1	▽▽	2 265	509	534.3	95.3	88.3	102.8	▽
高血圧症有病者	2 654	1 130	1212.4	93.2	89.2	97.4	▽▽	2 271	700	768.7	91.1	85.6	96.8	▽▽
高血圧症予備群	2 654	303	319.1	95.0	85.4	105.5	▽	2 271	228	250.3	91.1	80.6	103.0	▽
脂質異常症有病者	2 641	1 506	1567.9	96.1	92.9	99.3	▽▽	2 277	1 350	1288.6	104.8	101.3	108.4	▲▲
糖尿病有病者	2 564	393	384.7	102.2	93.3	111.8	▲	2 203	138	157.8	87.5	74.5	102.7	▽
糖尿病予備群	2 564	386	365.0	105.8	96.5	115.9	▲	2 203	293	253.5	115.6	104.0	128.5	▲▲
習慣的喫煙者	2 708	811	826.1	98.2	92.7	104.0	▽	2 332	127	181.8	69.9	59.0	82.7	▽▽